

Collagenase VI

胶原酶 VI 型

产品编号	产品名称	规格
BS955-100mg	胶原酶 VI 型	100mg
BS955-1g	胶原酶 VI 型	1g
BS955-10g	胶原酶 VI 型	10g
BS955-50g	胶原酶 VI 型	50g
BS955-100g	胶原酶 VI 型	100g

产品简介:

胶原酶 (Collagenase) 是一种蛋白酶, 能够特异性的识别 Pro-X-Gly-Pro 序列并切割该序列中性氨基酸 (X) 和甘氨酸 (Gly) 之间的肽键。许多蛋白酶都能水解单链且变性的胶原多肽, 但胶原酶是唯一一种可以降解具有三股超螺旋结构的天然胶原纤维的蛋白酶, 这种胶原纤维广泛存在结缔组织内。胶原酶有多种类型, 可根据所要分离消化的组织类型选择胶原酶类型。

- 1、胶原酶 I 用于上皮、肺, 脂肪和肾上腺组织细胞的分离。
- 2、胶原酶 II 适用于脂肪, 肝脏, 骨, 甲状腺, 心脏和唾液腺组织。
- 3、胶原酶 III 包含至少 7 种蛋白酶成分, 分子量从 68-130KD 不等。它能消化多种组织。
- 4、胶原酶 IV 包含至少 7 种蛋白酶成分, 分子量从 68-130KD 不等。它可用于胰腺小岛组织的分离, 将结缔组织分离成单个细胞。
- 5、胶原酶 VI 型有更高的酶活性且酪蛋白酶的活性和胶原酶活性为 2:1。

CAS: 9001-12-1

来源: 溶组织梭菌

活性 (效价): ≥ 400 units/mg

储存条件: 4°C, 避光干燥保存

外观 (性状): 棕色或棕褐色冻干粉末

单位: 瓶

有效期: 2 年

使用方法: (根据实际需要参阅相关文献配制和使用)

取胶原酶中加入到相应溶解液(根据特定的实验条件或者参考相应的文献资料确定所需的最佳工作浓度和体积), 轻轻旋涡震荡使其充分溶解, 然后用低蛋白结合性的 0.22 μ m 的滤膜过滤除菌即可使用, 或于分装后-20°C避光保存, 避免反复冻融。实验中需要根据特定的实验条件或者参考相应的文献资料确定所需的最佳工作浓度。

注意事项:

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

Note: For in vitro research use only, not for diagnostic or therapeutic use, This product is not a medical device.

注意: 在体外研究使用, 不用于诊断或治疗用途, 本产品不是医疗装置。

