

RapidCut SpeI

RapidCut SpeI 快速限制性内切酶

产品编号	产品名称	规格
BL1254A	RapidCut SpeI 快速限制性内切酶	50 T

产品简介:

本产品是一系列经过基因工程重组的快速限制性内切酶，适用于质粒 DNA、PCR 产物或基因组 DNA 等的快速酶切。所有快速内切酶在通用的 RapidCut Buffer 中都具有优良的活性，能够在 5~15 分钟内完成酶切。RapidCut Color Buffer 包括红色和黄色示踪染料，可将产物直接用于凝胶电泳。Color Buffer 的红色染料与 2500 bp 双链 DNA 片段在 1% 琼脂糖凝胶中迁移速率接近；黄色染料与 10 bp 双链 DNA 片段在 1% 琼脂糖凝胶中迁移速率接近。

产品组分:

组分名称	规格
RapidCut SpeI	50 µL
10× RapidCut Buffer	1 mL
10× RapidCut Color Buffer	1 mL

酶切位点:

5'...A↓CTAGT...3'
 3'...TGATC↑A...5'

产品特点:

- ✧ 通用缓冲液
- ✧ 快速内切酶，可在 5~15 min 内完成反应
- ✧ 3 h 温育未表现星号活性

失活条件

80°C 温育 20 min。

质量控制:

功能活性检测:

37°C 下，在 20 µL 通用 RapidCut 反应体系中，1 µL RapidCut SpeI 能够在 15 min 内完全消化 1 µg pUC19-SpeI DNA。

超长时间温育检测:

37°C 下，在 20 µL 通用 RapidCut 反应体系中，将 1 µL RapidCut SpeI 与 1 µg pUC19-SpeI DNA 共同温育 3 h，未检测到其他核酸酶污染或星号活性引起的底物非特异性降解。更长时间酶切可能出现星号活性。

酶切 - 连接 - 再酶切检测:

37°C 下，使用 10 倍酶量的 RapidCut SpeI 消化 DNA 底物，回收酶切产物，在 22°C 下使用 T4 DNA Ligase 可以将超过 95% 的酶切产物重新连接。将连接产物再次回收后，使用相同的内切酶可以重新切开 95% 以上的连接产物。

非特异性内切酶活性检测:

37°C 下，在 20 µL 通用 RapidCut 反应体系中将 1 µL RapidCut SpeI 与 1 µg 超螺旋质粒 DNA 共同温育 4 h 后，使用琼脂糖凝胶电泳检测，少于 10% 的质粒 DNA 转变成缺失或线性状态。

蓝白斑检测:

使用 1 µL RapidCut SpeI 消化含有 lacZα 基因且仅在该基因上具有 1 个酶切位点的特定载体。将酶切产物重新连接后转化到大肠杆菌感受态细胞中，涂布在含有 X-gal、IPTG 和相应抗生素的 LB 平板培养基上生长。成功连接的 β- 半乳糖苷酶基因可以正确表达，并生

Note: For in vitro research use only, not for diagnostic or therapeutic use, This product is not a medical device.
 注意: 在体外研究使用, 不用于诊断或治疗用途, 本产品不是医疗装置。



长出蓝色菌落；而因酶切末端降解等原因未能重新连接的产物将得到白色菌落。对于 RapidCut 系列限制酶而言，白色菌落的比例应当小于 1%。

使用方法：

1. DNA 快速酶切流程

(1) 在冰上按如下建议的加样顺序配制反应体系：

组分	质粒 DNA	PCR 产物	基因组 DNA
ddH ₂ O	15 µL	16 µL	30 µL
10× RapidCut Buffer 或 10× RapidCut Color Buffer	2 µL	3 µL*	5 µL
底物 DNA	2 µL (up to 1 µg)	10 µL (~ 0.2 µg)	10 µL (5 µg)
RapidCut SpeI	1 µL	1 µL	5 µL
Total	20 µL	30 µL	50 µL

*：本体系适用于经过纯化的 PCR 产物酶切。未纯化的 PCR 产物具备一定的离子强度，10× RapidCut Buffer 加入量可适当减少至 2 µL。但由于 DNA 聚合酶同时具有外切酶活性，会影响酶切产物，因此如下一步需进行克隆等操作，建议酶切前对 PCR 产物进行纯化。

- (2) 轻柔吸打或轻弹管壁以混匀（切勿涡旋），然后瞬时离心以收集挂壁液滴；
- (3) 37°C 温育 15 min（质粒），或 15~30 min（PCR 产物），或 30~60 min（基因组 DNA）；
- (4) 80°C 温育 20 min 即可使酶失活，停止反应（可选）；
- (5) 如果使用 RapidCut Color Buffer 进行酶切反应，得到的产物可以直接进行上样电泳。

2. 双酶切或多酶切

- (1) 每种快速内切酶的用量为 1 µL，并根据需要适当扩大反应体系；
- (2) 所有快速内切酶的体积总和不得超过总反应体系的 1/10；
- (3) 如果所用的几种快速内切酶的最适反应温度不同，应先以最适温度低的酶开始酶切，再添加最适温度较高的酶，在其最适反应温度下进行酶切反应。

3. 适用于质粒的扩大反应体系

组分	用量				
DNA	1 µg	2 µg	3 µg	4 µg	5 µg
RapidCut SpeI	1 µL	2 µL	3 µL	4 µL	5 µL
10× RapidCut Buffer 或 10× RapidCut Color Buffer	2 µL	2 µL	3 µL	4 µL	5 µL
ddH ₂ O	Up to 20 µL	Up to 20 µL	Up to 30 µL	Up to 40 µL	Up to 50 µL

注：如果总反应体系大于 20 µL，应适当增加温育时间，尽量使用水浴、金属浴或沙浴。

不同 DNA 中的酶切位点数量

λDNA	ΦX174	pBR322	pUC57	pUC18/19	SV40	M13mp18/19	Adeno2
0	0	0	0	0	0	0	3

甲基化修饰影响

Dam	Dcm	CpG	EcoKI	EcoBI
无影响	无影响	无影响	剪切受阻	剪切受阻

在不同品牌反应缓冲液中的兼容性

	RapidCut Buffer	Thermo Scientific FastDigest Buffer	NEB CutSmart® Buffer	Takara QuickCut™ Buffer
活性	100%	100%	100%	100%

注意事项：

- 1、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

Note: For in vitro research use only, not for diagnostic or therapeutic use, This product is not a medical device.

注意：在体外研究使用，不用于诊断或治疗用途，本产品不是医疗装置。





有效期:

-20°C储存, 2 年有效。

Note: For in vitro research use only, not for diagnostic or therapeutic use, This product is not a medical device.
注意: 在体外研究使用, 不用于诊断或治疗用途, 本产品不是医疗装置。

电话: 400-600-4213

邮箱: techserv@labgic.com

